

COVID-19 치료

빠른 안내

COVID-19 치료 유형	노출 전 예방	단클론 항체	경구용 항바이러스제	정맥주사(IV) 항바이러스제
이용 가능 치료제	Evusheld	Bebtelovimab	Lagevrio (molnupiravir) Paxlovid	VEKLURY (remdesivir)
이용 대상	<p>성인 및 소아 환자(12세 이상 및 체중 40kg 이상), 다음에 해당:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 현재 SARS-CoV-2 (COVID-19)에 감염 병력이 없는 자 • SARS CoV-2 (COVID-19)에 감염된 개인과 최근에 알려진 노출 이력이 없는 자 • 중등도에서 위중증의 면역저하자 • COVID-19 백신접종이 권장되지 않은 자 	<p>성인 및 소아 환자(12세 이상 및 체중 40kg 이상), 다음에 해당:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 입원 또는 사망 등 COVID-19으로 인해 위중증으로 진행될 위험이 높은 자 	<p>Paxlovid:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 성인 및 소아 환자(12세 이상 및 체중 40kg 이상) <p>Lagevrio:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 입원 또는 사망 등 COVID-19으로 인해 위중증으로 진행될 위험이 높은 성인 • 대체 COVID-19 치료 옵션이 권장되지 않거나 다른 COVID-19 치료에 접근할 수 없는 성인 	<p>성인 및 소아 환자(12세 이상 및 체중 40kg 이상), 다음에 해당:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 입원한 자 • 입원 또는 사망 등 COVID-19으로 인해 위중증으로 진행될 고위험군이 아니며 입원하지 않은 자 <p>소아 환자로 체중 3.5kg~40kg 미만 또는 소아 환자로 12세 미만의 체중 3.5kg 이상, 다음에 해당:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 입원한 자 • 입원 또는 사망 등 COVID-19으로 인해 위중증으로 진행될 고위험군이 아니며 입원하지 않은 자
이용 시점	백신접종 후 2주	COVID-19 양성 판정 후 7일 이내	COVID-19 양성 판정 후 5일 이내	COVID-19 양성 판정 후 7일 이내
이용 방법	의료서비스 제공자	의료서비스 제공자	의료서비스 제공자, 지역 약국	입원환자 의료서비스 시설

추가 정보 확인: hhs.gov



DOH 825-035 May 2022 Korean

본 문서를 다른 형식으로 요청하려면 1-800-525-0127번으로 전화하세요. 청각 장애 또는 난청 고객의 경우, 711(Washington Relay)로 전화하거나 civil.rights@doh.wa.gov로 이메일을 보내시기 바랍니다.