

دا نورمال خبره ده چې پدې اړه اندېښنه ولرئ د COVID-19 واکسين شايد د مثل توليد يا بارورۍ روغتيا باندې څنگه اغيزه لري. د 6 مياشتو او لدې ډير عمر لرونکو ټولو لپاره Centers for Disease Control and Prevention (CDC)، ناروغيو د کنترول او مخنيوي مرکز (ونو) د COVID-19 واکسين سپارښتنه کوي، پشمول د هغوی چې اوس غواړي بلاربي شي، يا هغوی چې ممکن غواړي په راتلونکي کې بلاربي شي. اوسمهال پدې اړه هيڅ شواهد شتون نلري چې کوم واکسين، پشمول د COVID-19 واکسين، اوس يا په راتلونکي کې د بلاربيدو اړوند ستونزو لامل کيږي.

ځينې لوستونکي ممکن پدې سند کې د پوښتنې لاندې نيول شوي موضوعات د ښيرازوالي مخکينيو ستونزو، د خلکو د رنگ له امله د تبديلي چلند تاريخي تروما، يا په طبي برخه کې د ښځو/ترانس نارينه او ښځو/نا سازگار جنډر خلکو د روغتيا عموماً له پامه غورځول شوي شکايتونو له امله حساس وي.

د COVID-19 واکسين او مثل توليد په اړه ځينې عام پوښتنو ته ځوابونو پوهيدو لپاره لاندې برخه وگورئ.

پوښتنه: آیا زما د ماشومانو درلودو وړتيا به د COVID-19 واکسين په واسطه اغيزمنه شي؟

ځواب:

COVID-19 واکسينونو کلينيکي آزموينونو کې، او د بلاربيدو هڅه کونکي جوړو پراخه راتلونکي مطالعه کې، د هغوی چې د COVID-19 واکسينونه يې کول او هغوی چې واکسينونه يې نه کول د بلاربيدو کچه يو شان وه. د کووېډ-19 واکسينونه خوندي او اغېزمن دي. د [Centers for Disease Control and Prevention \(CDC\)](#)، [ACOG](#)، [Society for Maternal-Fetal Medicine \(SMFM\)](#)، او [stsigolocenyG](#) (د امريکا نسايي او ولادي کالج)، او [dna snaicirtetsB fo egelloC naciremA](#) (د ماشومانو درملنې ټولنه) ټولو هغه خلکو لپاره د COVID-19 واکسين سپارښتنه کوي چې بلاربي دي، ماشوم ته تې ورکوي، يا پلان لري بلاربي شي.

پدې اړه د ډاکټر LaSalle وينا اوريدو لپاره چې ولې د COVID واکسين سپارښتنه شوي دي لنک ته ورشئ: [ښيرازوالی او د COVID-19 واکسين - يو ټيټوب](#)

پوښتنه: ايا واکسين به زما د حيض دوره بدل کړي؟

ځواب:

د COVID-19 واکسين شوي يوه برخه خلکو د واکسين کيدو وروسته د مياشتنۍ ناروغۍ دوره کې د بدلون راتلو راپور ورکړی دی، لکه د مياشتنۍ ناروغۍ ډير دوام کول، د دورو تر مينځ لنډه موده يا د عادي مهال پر تله د ډيرې ويني بهيدل. د [2022 يوه مطالعه کې](#)، موندل شوي چې مياشتنۍ ناروغي لرونکي هغه افراد چې د COVID-19 واکسين يې کړي د هغوی د دوزونو شاوخوا وخت کې د هغوی مياشتنۍ ناروغيو مودې په اوږدوالي کې د يوې ورځې څخه د کمې مودې ډيروالی درلود. د يوې ورځې بدلون د مياشتنۍ ناروغۍ مودې د بدلون نورمال حد کې دی. په مياشتنۍ ناروغۍ دوره کې د دې احتمالي لنډمهاله بدلونونو سربيره، پدې تړاو هيڅ شواهد شتون نلري چې د COVID-19 واکسين د ښيرازوالي ستونزو لامل کيږي. ستاسې مياشتنۍ ناروغۍ کې بدلون ممکن ستاسې د هغې وتلو وخت کې بدلون راولي. هغه خلک چې د کورني طبيعي پلانينگ او نور ميتودونه کاروي چې د مياشتنۍ ناروغۍ تعقيبولو باندې تکيه لري د هغوی لپاره ممکن دا ډير مشکل اوسي چې د هغې ونل مشخص کړي او د بلاربيدو مخنيوي/پلان وکړي. د خپلې مياشتنۍ ناروغۍ په اړه غږيدو او د کورني پلان په اړه نورو معلوماتو لپاره د خپل ډاکټر سره وغږيږئ.

پوښتنه: آیا د COVID-19 واکسين د زيږون کنترول باندې اغيزه کولی شي؟

ځواب:

د Planned Parenthood مطابق، پدې اړه هيڅ شواهد شتون نلري چې د COVID-19 واکسين د زيږون کنترول ډير يا لږ اغيزمن کوي. پدې وخت کې د واکسين شوي خلکو لخوا هيڅ راپورونه شتون نلري دا چې د واکسين کولو وروسته د هغوی زيږون کنترول کار کول پريښی دی. پداسې حال کې چې د مياشتنۍ ناروغۍ د بدلون راپورونه شتون لري، دا پدې اغيزه نلري چې د يوه فرد د زيږون کنترول څومره ښه کار کوي. دا د مياشتنۍ ناروغۍ او د هغې راتلو دورې تعقيبولو کې مشکل پيدا کولی شي؛ کوم خلک چې د زيږون طبيعي کنترول کاروي، لکه د ښيرازوالي د پوهاوي ميتود، د هغوی لپاره پدې پوهيدل ممکن مشکل اوسي چې کله يې هغې ووځي. د هغې د وتلو تعقيبولو کې د مرستې لپاره وسايل شتون لري. سپارښتنه کيږي چې ستاسې د خپلو انتخابونو په اړه او د نورو معلوماتو لپاره د خپل ډاکټر سره وغږيږئ.

پوښتنه: آیا واکسین کولی شي سپرم باندې اغیزه وکړي/یاد جنسي کمزوری لامل کيږي؟

ځواب: پدې اړه هیڅ شواهد شتون نلري چې وینې کوم واکسین، پشمول د COVID-19 واکسین، پدې وخت کې د نارینه د منل تولید غړو د بنیرازوالي مسایلو یاد جنسي کمزوری لامل کيږي. د 45 سالم نارینه و یوې وروستی کوچنی مطالعي چې د mRNA COVID واکسین یې کړي د سپرم مشخصاتو، لکه مقدار او حرکت ته د واکسین څخه مخکې او وروسته کتنه کړې ده. ځیرونکو د واکسین وهلو وروسته پدې سپرم ځانګړتیاو کې کوم مهم بدلون ندی موندلی. په ورته توګه، یوې مطالعي موندلې چې د COVID-19 عفونیت په ویروس د اخته کیدو وروسته تر 60 ورځو پورې د نارینه لپاره په بنیرازوالي کې د کمښت راتلو سره ممکن تړاو لري. د هرې ناروغی له امله تبه، او د COVID-19 عام علایم، د احتمال له مخې د سپرم تولید کې د لنډمهال کموالی لامل کیدی شي. که څه هم تبه د COVID-19 واکسین جاني عوارض کیدی شي، پدې تړاو هیڅ اوسني شواهد شتون نلري چې د COVID واکسین وروسته تبه د سپرم تولید باندې اغیزه کوي. که تاسې نورې اندیښنې لرئ د خپل ډاکټر سره وغږیږئ.

پوښتنه: آیا واکسین د IVF (ازمینیتي لقاح) درملني باندې اغیزه کوي؟

ځواب: هیڅ داسې شواهد شتون نلري چې وایې د COVID-19 واکسین د IVF درملني لاندې خلکو کې په پایلو باندې اغیزه کوي. مطالعاتو د IVF بریا کچه باندې د mRNA COVID-19 واکسین هیڅ اغیزې ندې موندلې. یوې مطالعي د نا واکسین شوي ناروغانو پرتله واکسین شوي خلکو ترمنځ د مبيض تحریک، هګی کیفیت، جنین وده، یا د بلاربیډو پایلو په غبرګون کې هیڅ د پام وړ توپیرونه ندې موندلې. ندې موندل شوي چې د COVID-19 واکسین په بنیرازوالي اغیزه کوي، نه هم د بلاربیډو هڅې سره واردمخه لاس او ګریوان خلکو لپاره نورې ستونزې پیدا کوي. ډیری واکسینونه په منظم ډول د بلاربیډو پرمهال او مخکې په خوندي ډول کيږي، لکه د زکام، تیتانوس، او دفتريا واکسین. د COVID-19 واکسین د 6 میاشتو او ډیر عمر لرونکي ټولو خلکو لپاره سپارښتنه کيږي، پشمول د هغوی چې هڅه کوي بلارب شي.

پوښتنه: آیا د COVID-19 واکسین د جنین د سقط لامل کیدی شي؟

ځواب: نه، د COVID-19 واکسین د بلاربیډو څخه مخکې، پرمهال او وروسته خوندي دي. پدې اړه هیڅ شواهد نشته چې د COVID-19 واکسین کول د جنین د سقط خطر ډیروي. د COVID-19 پر وړاندې واکسین شوي خلکو ترمنځ د جنین سقط لوره کچه نده موندل شوي. د جنین سقط کچه د هغه څه څخه لوره ده چې خلک فکر کوي، د شاوخوا 10 څخه تر 20 سلنه پورې امیندواری د جنین سقط سره پای ته رسيږي. ځینې خلک چې واکسین شوي ممکن د جنین سقط تجربه کړي، مګر دا واکسین پورې تړاو نلري – د جنین سقط د واکسین وضعیت پام کې نیولو پرته پېښیدی شي. په حقیقت کې، هغه خلک چې د بلاربتوب په پیل کې د COVID-19 شدید عفونیت سره مخ کيږي د جنین سقط ډیر خطر سره مخ دي. واکسین د COVID-19 پر وړاندې ستاسې، او ستاسې د ماشوم غوره محافظ دی.

سرچینې

.Centers for Disease Control and Prevention, "COVID-19 Vaccines for People Who Would Like to Have a Baby". 2022
[COVID-19 Vaccines for People Who Would Like to Have a Baby | CDC](#) آنلاین شتون لري په:

American College of Obstetricians and Gynecologists, "COVID-19 Vaccination Considerations for Obstetric-Gynecologic Care". 2022
[COVID-19 Vaccination Considerations for Obstetric-Gynecologic Care | ACOG](#) آنلاین شتون لري په:

World Health Organization, "Questions and Answers: COVID-19 vaccines and pregnancy." 2022
[Questions and Answers: COVID-19 vaccines and pregnancy \(who.int\)](#) آنلاین شتون لري په:

Mount Sinai, "Large Study Provides Reassurance that COVID-19 Vaccination Does Not Affect Fertility or Early Pregnancy." 2022
[Large Study Provides Reassurance that COVID-19 Vaccination Does Not Affect Fertility or Early Pregnancy | Mount Sinai - New York](#) آنلاین شتون لري په:

د شخصي طبي پریکړو په اړه تل د خپل باوري روغتیایي کلرکونکي سره مشوره وکړئ.