

什麼是乙型肝炎？

乙型肝炎病毒是一種攻擊肝臟的病毒。如不及時治療，可能會導致肝衰竭和肝癌。

據估計，全球有 2.96 億乙型肝炎患者。但許多人對自己是否感染一無所知，因為他們感覺身體並無異樣或不適。

乙型肝炎主要透過接觸感染者的血液或體液，在人與人之間傳播。

乙型肝炎與懷孕

若您目前懷孕，那麼作為產前護理的一部分，您應進行血檢，以確認是否患有乙型肝炎。

若您感染乙型肝炎，那麼在分娩時會將乙型肝炎傳染給新生兒。

若您懷孕並患有乙型肝炎，那麼寶寶在出生時接種一系列乙型肝炎疫苗，便可防止感染。



欲瞭解更多資訊：

Centers for Disease Control and Prevention
(CDC, 疾病控制與預防中心)

www.cdc.gov/hepatitis/hbv/

HepB Moms

www.hepbmoms.org (英文)



DOH 420-406 May 2022 Traditional Chinese

若您需要本文檔的其他格式，請致電 1-800-525-0127。
失聰或聽障客戶請致電 711 (Washington Relay) 或傳送電郵至 civil.rights@doh.wa.gov。

資料來源：CDC, Protect Your Baby for Life

乙型肝炎：
為保護您和寶寶，
您需要瞭解
一些重要事項





保護您的寶寶免受乙型肝炎的侵害

寶寶在出生後 24 小時內應接種第一劑乙型肝炎疫苗。
若您的乙型肝炎檢測呈陽性，那麼寶寶在出生後 12 小時內必須注射乙肝免疫球蛋白 (HBIG)。

寶寶需要接種全部 3 劑乙型肝炎疫苗和注射 HBIG，以防止他們感染乙型肝炎。寶寶出生後 9-12 個月應接受檢測，以確定寶寶是否免於感染。

接種期限	乙型肝炎孕婦患者所生嬰兒應
出生時	在出生時接種乙型肝炎疫苗和乙肝免疫球蛋白 (HBIG)
1-2 個月	接種第二劑乙型肝炎疫苗
6 個月	接種第三劑乙型肝炎疫苗
9-12 個月	接受檢測，以確定寶寶是否免於感染

以下是保護寶寶的其他方法：

- 即使您患有乙型肝炎，也仍可以母乳餵養寶寶。但若您在母乳餵養時，乳頭破裂和出血，請與醫生聯絡，醫生會為您提供多種方案。
- 請妥善保存乙型肝炎疫苗接種記錄，就診時請隨身攜帶。
- 您的家人也應接受乙型肝炎檢測並接種疫苗。

乙型肝炎對於我的寶寶是否危險？

若新生兒感染乙型肝炎，那麼他們有 90% 的幾率患上慢性肝炎並將持續終身。

如不及時治療，那麼約四分之一的乙型肝炎患兒會出現嚴重的肝病，如肝損傷、肝炎或肝癌。

慶倖的是，只要接種非常安全有效的疫苗，即可防止新生兒感染乙型肝炎。

若您不是乙型肝炎患者

您仍可接種安全有效的疫苗，以保護自己和寶寶。
務必要接種全部劑次！

接種期限	嬰兒應
出生時	在出生後立即接種乙型肝炎疫苗
1-2 個月	接種第二劑乙型肝炎疫苗
6 個月	接種第三劑乙型肝炎疫苗

若您患有乙型肝炎，要尤為關注自己的健康狀況

您需要接受額外檢測，以檢查肝臟健康狀況，並確認是否需要治療。

乙型肝炎患者可接受抗病毒藥物的治療。但並非所有患者均需要治療。

在服用任何處方藥、非處方藥、補充劑或維生素之前，請諮詢醫生，因為某些藥物可能會造成肝損傷。

接種甲型肝炎疫苗對您也大有裨益。分娩後，請繼續前往醫生處複查，以監測感染情況。