

តើអ្នកគួរតែចាក់វ៉ាក់សាំងរោគរលាក ថ្លើមប្រភេទ B ដែរទេ?




រោគរលាកថ្លើមប្រភេទ B គឺជាវីរុសដែលវាយប្រហារថ្លើម និងអាចបង្កជាមហារីកថ្លើម។



មនុស្សជាច្រើនមិនដឹងខ្លួនថាបានឆ្លងមេរោគ ដោយសារពួកគេមិនមានអារម្មណ៍ ឬមើលទៅដូចជាមានជំងឺទេ ប៉ុន្តែពួកគេអាចចម្លងមេរោគនេះទៅអ្នកដទៃបាន។



មានវ៉ាក់សាំងដែលមានប្រសិទ្ធភាព និងសុវត្ថិភាពដែលអាចបង្ការរោគរលាកថ្លើមប្រភេទ B។ អ្នកត្រូវចាក់ឱ្យបានគ្រប់ចំនួន ទើបអាចការពារបានពេញលេញ។



រោគរលាកថ្លើមប្រភេទ B ចម្លងតាមរយៈ៖



មនុស្សមានផ្ទៃពោះទៅទារក អំឡុងពេលសម្រាលកូន



ការប៉ះពាល់ផ្លូវភេទ



ការប៉ះពាល់ឈាមរបស់មនុស្សដែលបានឆ្លងរោគ



ការប្រើផ្ទៃឡាម ប្រាស ដុសធ្មេញ ឬកន្ត្រៃកាត់ក្រចករួមគ្នា

តើនរណាខ្លះគួរចាក់វ៉ាក់សាំង?

- ✓ ទារកគ្រប់រូប
- ✓ កុមារ និងមនុស្សពេញវ័យអាយុរហូតដល់ 59 ឆ្នាំដែលមិនបានចាក់វ៉ាក់សាំងគ្រប់រូប ដោយមិនគិតពីកត្តាហានិភ័យផ្សេងៗ
- ✓ មនុស្សពេញវ័យអាយុ 60 ឆ្នាំឡើងទៅដែលមានកត្តាហានិភ័យដូចជា៖
 - ការប៉ះពាល់ផ្លូវភេទ
 - ការចាក់ថ្នាំតាមវិស្វក ឬភ្នែក/មាត់/ច្រមុះប៉ះពាល់ជាមួយនឹងឈាម
 - ធ្វើដំណើរទៅតំបន់ដែលរោគរលាកថ្លើមប្រភេទ B មានអត្រាឆ្លងមធ្យមឬខ្ពស់
 - ឆ្លងវីរុស HIV ឬជំងឺថ្លើមរ៉ាំរ៉ៃ

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម៖
www.cdc.gov/hepatitis/hbv/
doh.wa.gov/hepbhub



DOH 420-407 May 2022 Khmer

ដើម្បីស្នើសុំឯកសារនេះជាទម្រង់ផ្សេងទៀត សូមទូរសព្ទទៅលេខ 1-800-525-0127។ អតិថិជនស្តាប់មិនឮ ឬស្តាប់មិនសូវឮ សូមទូរសព្ទទៅលេខ 711 (Washington Relay) ឬផ្ញើអ៊ីមែលទៅ civil.rights@doh.wa.gov។ បានកែសម្រួលដោយមានការអនុញ្ញាតពី Minnesota Department of Health (ក្រសួងសុខាភិបាលនៃរដ្ឋមីណេសូតា)