

# Рекомендації щодо щеплення оновленою вакциною проти COVID-19 для дітей віком від 6 місяців до 4 років



Оновлена вакцина проти COVID-19 сезону 2023/2024 років може захистити дітей молодшого віку від важкого перебігу хвороби, госпіталізації та навіть смерті від COVID-19. Дослідження показали, що, хоча вакцини залишаються ефективним засобом боротьби з COVID-19, дієвість їхнього захисту може згодом послаблюватися.

**Найефективнішим способом продовжити такий захист залишається отримання всіх необхідних щеплень вакциною проти COVID-19.**

Ознайомтеся з таблицею нижче, щоб дізнатися, скільки доз вакцини проти COVID-19 необхідно отримати вашій дитині.

Виробник вакцини	Вік	Для дітей, яким не робили щеплення	Для дітей, яким робили щеплення проти COVID-19
Pfizer	Від 6 місяців до 4 років	<b>1-ша доза:</b> оновлена вакцина сезону 2023/2024 років. <b>2-га доза:</b> оновлена вакцина сезону 2023/2024 років через 3–8 тижнів після щеплення 1-ю дозою. <b>3-тя доза:</b> оновлена вакцина сезону 2023/2024 років не раніше ніж через 8 тижнів після щеплення 2-ю дозою.	<b>Дитина отримала одну дозу:</b> 2-га доза оновленої вакцини сезону 2023/2024 років через 3–8 тижнів після першого щеплення.  3-тя доза через 8 тижнів після щеплення 2-ю дозою оновленої вакцини сезону 2023/2024 років.  <b>Дитина отримала дві чи більше доз:</b> 1 доза оновленої вакцини сезону 2023/2024 років не раніше ніж через 8 тижнів після останнього щеплення.
	Від 6 місяців до 4 років	<b>1-ша доза:</b> оновлена вакцина сезону 2023/2024 років. <b>2-га доза:</b> оновлена вакцина сезону 2023/2024 років через 4–8 тижнів після щеплення 1-ю дозою.	<b>Дитина отримала одну дозу:</b> 1 доза через 4–8 тижнів після останнього щеплення оновленою вакциною сезону 2023/2024 років.  <b>Дитина отримала дві чи більше доз:</b> 1 доза через 4–8 тижнів після останнього щеплення оновленою вакциною сезону 2023/2024 років.
Novavax		Вакцина Novavax недоступна для осіб віком до 12 років.	

*Якщо ви страждаєте на імунну недостатність середнього або важкого ступеня, рекомендації відрізнятимуться.*



\*Людам, які нещодавно перенесли зараження SARS-CoV-2, варто розглянути можливість відкласти вакцинацію проти COVID-19 на 3 місяці з моменту появи симптомів або отримання позитивного результату тесту (якщо зараження пройшло без симптомів). Дослідження свідчать, що збільшення перерви між зараженням і вакцинацією може сприяти покращенню імунної відповіді організму на вакцинацію. Крім того, протягом кількох тижнів або місяців після зараження спостерігається низький ризик повторного інфікування. Вирішуючи, чи варто відкласти вакцинацію після зараження, потрібно брати до уваги окремі фактори, як-от ризик тяжкого перебігу захворювання COVID-19, рівень розповсюдження COVID-19 у спільноті або характеристики панівного штаму SARS-CoV-2.